



UTERTAB

2000 mg

NO LUGAR CERTO

Comprimidos intrauterinos de cloridrato de
tetraciclina para bovinos

Along with you



UTERTAB

2000 mg

Comprimidos intrauterinos de cloridrato de tetraciclina para bovinos



NO LUGAR CERTO

BLISTER PERFURADO

Permite uma melhor selagem, o que mantém os comprimidos bem preservados em condições de campo.



TRATAMENTO LOCALIZADO

A administração intra-uterina permite que atue diretamente no tecido alvo, "NO LUGAR CERTO"



UTERTAB 2000 mg comprimido intrauterino para bovinos.

Composição qualitativa e quantitativa: Cada comprimido intra-uterino contém: Substância activa: Cloridrato de tetraciclina 2000 mg.

Forma farmacéutica

Comprimido intrauterino. Comprimido amarelo com linha marcada no centro. A linha marcada não se destina a dividir o comprimido em doses iguais.

Espécies alvo

Bovinos (vacas em lactação).

Indicações de utilização, especificando as espécies-alvo

Para o tratamento e a prevenção de distúrbios pós-parto em bovinos: para administração subsequente à retenção de membranas fetais e endometrite provocada por agentes patogénicos sensíveis à tetraciclina, bem como após intervenções obstétricas (fetotomia, cesariana).

Contraindicações

Não administrar em caso de infecções provocadas por agentes patogénicos resistentes à tetraciclina.
Não administrar em caso de hipersensibilidade à substância ativa ou a algum dos excipientes.
Não administrar em caso de doenças renais ou hepáticas graves.

Advertências especiais para cada espécie-alvo

Não existem.

Precauções especiais de utilização

Precauções especiais para a utilização em animais: Sempre que possível, o medicamento veterinário só deve ser utilizado com base em testes de sensibilidade. As políticas antimicrobianas oficiais, nacionais e regionais devem ser consideradas para a utilização do medicamento veterinário. Os bezerros não devem ser alimentados com o leite das vacas tratadas até ao fim do intervalo de segurança para o leite, exceto durante a fase de colostro, devido à possibilidade da seleção de resistência.
Precauções especiais a adotar pela pessoa que administra o medicamento veterinário aos animais: Este medicamento veterinário pode provocar sensibilização. Evitar o contacto direto com a pele ou membranas mucosas. Devem ser usadas luvas durante o manuseamento do medicamento veterinário.
Lavar as mãos após a administração.

Reações adversas (frequência e gravidade)

A ocorrência de doenças renais é acentuada em animais desidratados. A tetraciclina poderá causar danos no fígado. Ocorre frequentemente fotodermatite em áreas cutâneas esparsamente pigmentadas se estas forem expostas a luz solar intensa. As reações alérgicas são raras. Em caso de reação alérgica ou anafilática, interromper imediatamente o tratamento. As reações alérgicas podem ser tratadas de forma parentérica com glucocorticoides e anti histamínicos

Utilização durante a gestação, a lactação ou a postura de ovos

Este medicamento veterinário destina-se especificamente a utilização no período pós-parto.

Interações medicamentosas e outras formas de interação

Existe uma possibilidade de antagonismo entre as tetraciclinas e os antibióticos com ação bactericida.

Posologia e via de administração

Via intrauterina.
Vacas: 2 g de cloridrato de tetraciclina/vaca/dia equivalente a 1 comprimido/vaca/dia
Tratar uma a três vezes em intervalos de 1 até 2 dias.

Sobredosagem (sintomas, procedimentos de emergência, antídotos), (se necessário)

Não se prevê sobredosagem, porque cada comprimido representa uma única dose.

Intervalo(s) de segurança

Bovinos: Carne e vísceras 10 dias
Leite 96 horas

Precauções especiais de conservação

Este medicamento veterinário não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

Natureza e composição do acondicionamento primário

Caixa de cartão com 10 e 100 comprimidos intra-uterinos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

aniMedica GmbH
Im Südfeld 9
48308 Senden-Bösensell
Alemanha

Número de Autorização de Introdução no Mercado

1198/01/18DFVPT